

## R2年～4年市町村別主要死因別標準化死亡比 (SMR)


### 脳血管疾患

|      | 男   |       |       |       | 区分           | 女   |       |       |      | 区分           |
|------|-----|-------|-------|-------|--------------|-----|-------|-------|------|--------------|
|      | 死亡数 | SMR   | 上限    | 下限    |              | 死亡数 | SMR   | 上限    | 下限   |              |
| 宮崎市  | 525 | 97.8  | 106.6 | 89.7  | 2 低い(有意ではない) | 573 | 100.6 | 109.3 | 92.6 | 3 高い(有意ではない) |
| 都城市  | 240 | 101.6 | 115.5 | 89.3  | 3 高い(有意ではない) | 288 | 103.3 | 116.1 | 91.8 | 3 高い(有意ではない) |
| 延岡市  | 223 | 117.3 | 134.0 | 102.7 | 4 高い(有意)     | 246 | 109.6 | 124.5 | 96.6 | 3 高い(有意ではない) |
| 日南市  | 99  | 104.9 | 128.3 | 85.7  | 3 高い(有意ではない) | 129 | 117.0 | 139.5 | 98.1 | 3 高い(有意ではない) |
| 小林市  | 76  | 94.5  | 118.9 | 74.9  | 2 低い(有意ではない) | 93  | 96.5  | 118.8 | 78.4 | 2 低い(有意ではない) |
| 日向市  | 83  | 89.7  | 111.8 | 71.9  | 2 低い(有意ではない) | 70  | 68.7  | 87.4  | 54.0 | 1 低い(有意)     |
| 串間市  | 40  | 111.9 | 153.9 | 81.0  | 3 高い(有意ではない) | 37  | 82.7  | 115.3 | 59.1 | 2 低い(有意ではない) |
| 西都市  | 72  | 132.1 | 167.4 | 104.1 | 4 高い(有意)     | 68  | 113.4 | 144.7 | 88.7 | 3 高い(有意ではない) |
| えびの市 | 38  | 105.6 | 146.6 | 75.8  | 3 高い(有意ではない) | 32  | 78.1  | 111.7 | 54.3 | 2 低い(有意ではない) |
| 三股町  | 20  | 59.7  | 94.0  | 37.5  | 1 低い(有意)     | 37  | 93.9  | 130.9 | 67.1 | 2 低い(有意ではない) |
| 高原町  | 19  | 100.8 | 160.6 | 62.5  | 3 高い(有意ではない) | 13  | 64.9  | 114.2 | 36.1 | 2 低い(有意ではない) |
| 国富町  | 38  | 116.9 | 162.2 | 83.9  | 3 高い(有意ではない) | 41  | 111.3 | 152.5 | 80.9 | 3 高い(有意ではない) |
| 綾町   | 12  | 96.6  | 174.1 | 52.4  | 2 低い(有意ではない) | 11  | 83.4  | 154.2 | 43.9 | 2 低い(有意ではない) |
| 高鍋町  | 27  | 91.8  | 135.6 | 61.7  | 2 低い(有意ではない) | 33  | 103.9 | 147.7 | 72.7 | 3 高い(有意ではない) |
| 新富町  | 25  | 98.2  | 147.2 | 64.9  | 2 低い(有意ではない) | 26  | 100.1 | 149.0 | 66.8 | 3 高い(有意ではない) |
| 西米良村 | 3   | 135.7 | 432.6 | 35.1  | 3 高い(有意ではない) | 5   | 191.0 | 473.9 | 70.3 | 3 高い(有意ではない) |
| 木城町  | 8   | 90.2  | 185.5 | 42.0  | 2 低い(有意ではない) | 16  | 155.1 | 258.0 | 91.8 | 3 高い(有意ではない) |
| 川南町  | 18  | 68.7  | 110.9 | 42.0  | 2 低い(有意ではない) | 34  | 115.7 | 163.6 | 81.4 | 3 高い(有意ではない) |
| 都農町  | 11  | 60.2  | 111.3 | 31.7  | 2 低い(有意ではない) | 24  | 121.7 | 184.1 | 79.8 | 3 高い(有意ではない) |
| 門川町  | 36  | 133.8 | 187.4 | 95.1  | 3 高い(有意ではない) | 27  | 90.6  | 133.9 | 60.9 | 2 低い(有意ではない) |
| 諸塚村  | 0   | -     | -     | -     |              | 1   | 22.7  | 147.3 | 1.2  | 2 低い(有意ではない) |
| 椎葉村  | 7   | 102.4 | 221.2 | 44.9  | 3 高い(有意ではない) | 5   | 73.9  | 183.4 | 27.2 | 2 低い(有意ではない) |
| 美郷町  | 8   | 58.7  | 120.7 | 27.3  | 2 低い(有意ではない) | 11  | 73.9  | 136.6 | 38.9 | 2 低い(有意ではない) |
| 高千穂町 | 14  | 53.3  | 91.8  | 30.3  | 1 低い(有意)     | 19  | 63.2  | 100.8 | 39.2 | 2 低い(有意ではない) |
| 日之影町 | 10  | 115.1 | 219.4 | 58.5  | 3 高い(有意ではない) | 8   | 82.7  | 170.0 | 38.4 | 2 低い(有意ではない) |
| 五ヶ瀬町 | 7   | 87.1  | 188.2 | 38.2  | 2 低い(有意ではない) | 14  | 150.4 | 259.2 | 85.6 | 3 高い(有意ではない) |


\*宮崎県健康づくり推進センター「データブック」男女別年齢階級別人口(市町村別)、主要死因死亡数・率・割合(市町村別)のR2・R3・R4のデータを基に算出。

\*標準化死亡比=当該市町村の死亡数/(当該市町村の年齢階級別人口×宮崎県の年齢階級別死亡率)の総和×100(今回から単年度算出方法と合わせ、結果を見やすくするために100かけている。)

\*全年齢の死亡数が「0」の場合、標準化死亡比を「-」と記載。年齢階級は、5歳刻みで下限0歳、上限95歳一括とした。(「H27～H29」のデータまでは、上限85歳一括で算定)



SMR 脳血管疾患 男 0 20km



SMR 脳血管疾患 女 0 20km